

Intelligence Artificielle - TD 6

Exercices tirés de www.grappa.univ-lille3.fr/grappa/index.php3?info=apprentissage

Exercice 1 Soit une population Π d'individus qui consiste en un échantillon composé d'ouvrier, de médecins et d'employés des télécoms. On décrit les individus par un attribut logique *hautdebit* qui vaut vrai si l'individu possède l'internet haut débit et faux sinon. L'espace de description est donc égal à l'ensemble $\{\text{hautdebit}, \overline{\text{hautdebit}}\}$. On souhaite répartir les individus en trois classes *ouvrier*, *medecin* et *telecom*. On dispose des informations suivantes :

classe k	<i>telecom</i>	<i>medecin</i>	<i>ouvrier</i>
$P(k)$	0.2	0.3	0.5
$P(\text{hautdebit}/k)$	1	0.9	0.45

Une première règle possible pour le choix de la fonction de classement C pourrait être : “attribuer à chaque description la classe majoritaire”, c'est-à-dire celle pour laquelle $P(k)$ est maximum; c'est la règle *majoritaire*.

Une seconde règle consiste à raisonner ainsi : “si j'observe d , je choisis la classe pour laquelle cette observation est la plus probable”, c'est-à-dire $P(d/k)$ est maximum. C'est la règle dite du *maximum de vraisemblance*.

Une troisième règle (*règle de Bayes*) consiste à attribuer à une description d la classe k qui maximise la probabilité $P(k/d)$ qu'un élément ayant d pour description soit de classe k . La quantité $P(k/d)$ peut être estimée en utilisant la formule de Bayes, il suffit donc de choisir la classe k qui maximise le produit $P(d/k)P(k)$.

Décrire sur cet exemple les trois fonctions $C_{\text{majoritaire}}$, $C_{\text{vraisemblance}}$ et C_{Bayes} .

On peut définir la probabilité d'erreur d'une fonction de classement de la façon suivante : soit C une fonction de classement, l'erreur $E(d)$ (ou probabilité d'erreur) pour une description d est la probabilité qu'un élément de la population Π de description d soit mal classé par C , l'erreur $E(C)$ d'une fonction de classement est la moyenne pondérée des erreurs sur les descriptions d . Calculer les erreurs pour les trois procédures de classification trouvées précédemment.

Exercice 2 La population Π est un ensemble de champignons. Il y a deux classes $\{1, 2\}$ de champignons, où 1 est la classe des champignons vénéneux. Le langage de description est constitué de l'attribut binaire *volve* (c'est une membrane qui enveloppe certains champignons). On dispose des informations suivantes :

classe k	1 : vénéneux	2 : comestible
$P(k)$	0.05	0.95
$P(\text{volve}/k)$	0.9	0.2

- Je ramasse les champignons si le règle de Bayes les classifie dans la classe des comestibles. Donnez la fonction C_{Bayes} pour cet exemple. Est-ce-que je ramasse les champignons ayant une volve ? Appliqueriez-vous cette règle si vous alliez ramasser des champignons ?
- On définit un coût pour tout couple de classes (k, i) noté $\text{cout}(k, i)$. On définit alors le coût moyen de l'affectation à la classe k d'une description d de D par :

$$\text{cout_moyen}(k/d) = \sum_{i \in \{1, \dots, c\}} \text{cout}(k, i) \times P(i/d).$$

La règle de décision du coût minimum est : “Choisir $C_{\text{cout_min}}$ qui à toute description d associe la classe k qui minimise $\text{cout_moyen}(k/d)$ ”.

On définit sur notre exemple les coûts suivants :

$$\text{cout}(1, 1) = \text{cout}(2, 2) = 0, \quad \text{cout}(1, 2) = 2, \quad \text{cout}(2, 1) = \infty.$$

J'utilise la règle du coût minimal. Est-ce-que je ramasse les champignons ayant une volve ?

Exercice 3 On considère deux attributs pour déterminer la nationalité d'un individu. L'attribut *taille* qui peut prendre les valeurs grand ou petit, l'attribut *couleur des cheveux* qui peut prendre les valeurs brun ou blond. Les nationalités possibles sont français et allemand.

On suppose que les populations françaises et allemandes se répartissent selon le tableau suivant :

	petit,brun	petit,blond	grand,brun	grand,blond
français	25	25	25	25
allemand	10	20	30	40

- Est-ce que les attributs *taille* et *couleur* sont indépendants connaissant la classe (français ou allemand) ?
- Dans une assemblée comprenant 60% d'allemands et 40% de français, décrire
 1. la règle de décision majoritaire
 2. la règle du maximum de vraisemblance
 3. la règle de Bayes
- Calculer les probabilités d'erreur de chacune des règles.
- On suppose maintenant que l'on ne connaît plus les proportions respectives des allemands et des français. On note p la proportion des allemands ($p \in [0, 1]$).
 - Décrire, selon les valeurs possibles de p , les règles de Bayes correspondantes.
 - Parmi les 5 règles que vous aurez détaillées à la question précédente, choisir celle qui **dans les pire des cas** possède la probabilité d'erreur minimale.